


カムカム歯科医院の歯周病治療の流れ

歯周組織検査

●口腔内写真




●エックス線写真




●歯周ポケットの深さ測定

●出血の有無

●排膿の有無




●動揺度の測定




「歯周病の進行」と「歯周ポケットの深さの目安」


健康 3mm以内 → 軽度 3～4mm → 中等度 5～6mm → 重度 7mm以上




歯槽骨 (歯を支える骨)



骨はまだ正常



骨が溶けてきている




骨が無くなってしまっている

処置


歯周病の状態にあった治療をしていきます

①スクレーピング




歯に付着した歯石(細菌)を取り除きます。

②ルートプレーニング



①で改善が見られない場合はさらに深い部分の歯石を取り除きます。


③外科処置



①と②で改善が見られない場合は、外科的な治療を行う必要があります。

口腔内清掃指導 (TBI)

●プラークの染め出し



●歯ブラシの指導



再評価検査

処置の効果が出ているか、再度検査します

現状の説明と今後の治療説明

改善が見られない場合

改善が見られる場合

定期検診へ

定期的にメンテナンスしよい状態を保ちましょう

治療へ

歯周病の原因となるプラークは3カ月ほどで元のような状態になります。定期検診で良い状態を保ちましょう。

